

[illegible]

يعطى اللقاح ذو الجرعة الواحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة ، الذين لهم وضع تلقيحي غير واضح والذين ولدوا بعد عام 1970 ولم يتم تلقيحهم قبلاً أو كانوا قد تلقوا تلقيحاً واحداً في طفولتهم. من المفضل تلقيحهم بلقاح النكاف/الحصبة/الحصبة الألمانية (ام ام ار).

٥ التلقيح يست النموذجي للفتيات تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 13 أو 9 إلى 14 سنوات (اعتمادا على مادة اللقاح). لمعرفة عدد جرعات اللقاح انظر وصف المعلومات!

9 يعطى اللقاح المعزز للكرزاز والحناق (تي دي) كل عشرة سنوات. ويعطى اللقاح التالي في موعده بجرعة واحدة مكونة من الكزاز/الحناق/السعال الديكي اللاخوي (تي دي اي بي) أو، ان استدعى ذلك، على شكل مزيج من الكزاز/الحناق/السعال الديكي اللاخوي - لقاح شلل الاطفال الغم مُنشط (تي دي اي بي - اي بي في).

١ هذه الجرعة غير مطلوبة عند استخدام لقاح احادي التكافؤ.

ب) يجب القيام بالتلقيحات للمرة الاولى من عمر ستة اسابيع. وبحسب نوع اللقاح، يتطلب ان يُعطى على شكل جرعتين او ثلاثة جرعات على فترات تتباعد عن بعضها باربعة اسابيع على الاقل.

٢٠ يوصى إعطاء اللقاح ذو الجرعة الواحدة الذي يحتوي على لقاح البوليساكنين، التلقيح المعزز لحالات معينة فقط.

ملاحظات توضيحية

G التلقيحات الأساسية (الف)

التلقيحات النموذجية	S
---------------------	---

التلقيحات المعجزة
التلقيحات للحقبة (تلقيحات أساسية لكل من لم يتم تلقيحه قبلاً أو لتكملة سلسلة التلقيحات الناقصة)

الفحص التشخيصي المبكر

فحص الشباب (ج أي من عمر 12-14 سنة)