



Avis concernant la prophylaxie de la méningite à méningocoques pour les pèlerins à La Mecque

CSH : 5231

Juin 2001

Au vu des données les plus récentes concernant le risque de méningite associé au pèlerinage à La Mecque, il s'avère que le taux de portage au retour des voyageurs est faible (2,6%) mais que la proportion du sérotype W135 est prédominante (26% des souches isolées chez les porteurs), ce qui confirme la circulation de ces souches en Arabie Séoudite.

En conséquence , le CSH :

- Recommande la vaccination par le vaccin tétravalent A,C,Y,et W135 de tous les pèlerins.
- Ne recommande pas l'instauration d'une chimioprophylaxie par antibiotique au retour de La Mecque.

Bibliographie

Group A meningococcal carriage in travelers returning from Saudi Arabia., Jama,1988, 260,18,2686-2689.

Update : assessment of risk for meningococcal disease associated with the Hajj 2001, MMWR 30 mars 2001,50,12,221-222

Serogroup W135 meningococcal disease in Hajj pilgrims, Lancet,2000,356, 2159.

Adresse de correspondance :

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement
Conseil Supérieur d'Hygiène

Adresse : C.A.E. - Quartier Esplanade 718
Boulevard Pachéco 19 Bte 5
B - 1010 BRUXELLES

Fax : 02/210.64.07

E-mail : guy.devleeschouwer@health.fgov.be
