



Sprache: Russisch

ВОЗРАСТ	(в неделях)	Новорожденные (в месяцах)			Младенцы		Дети (в годах)			Подростки	Взрослые		
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	с 18	с 60
ВАКЦИНАЦИЯ			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Столбняк		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (каждые 10 лет в случае) f			
Дифтерия		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (каждые 10 лет в случае) f			
Коклюш		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (в случае необходимости) f			
Полиомиелит		G1	G2 ^a	G3	G4	N			A1	N (в случае необходимости)			
Гепатит В		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Гемофильная инфекция тип b		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Пневмококк		G1	G2	G3	G4	N						S ^c	
Ротавирус		G1 ^b	G2	(G3)									
Менингококк Серогруппа C					G1 (с 12 месяцев)		N						
Корь					G1	G2	N					S ^d	
Свинка Краснуха (MMR)					G1	G2	N						
Ветряная оспа					G1	G2	N						
Грипп												S (ежегодно)	
ВПЧ Вирусы папилломы человека							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Даты следующих прививок



Gefördert durch:

 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

ПОЯСНЕНИЯ

- G** БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (включая до 4-х этапов G1 – G4)
- S** СТАНДАРТНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ
- A** РЕВАКЦИНАЦИЯ
- N** НАВЕРСТЫВАЮЩАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (Основная иммунизация всех лиц, которые до текущего момента не были вакцинированы или завершение неполной серии прививок)
- U** Профилактическое обследование
- J** Обследование подростков (J1 – в возрасте 12–14 лет)

- a** Эта доза не требуется при использовании моновалентной вакцины.
- b** Первую вакцинацию необходимо проводить в возрасте от 6 недель. В зависимости от используемой вакцины следует ввести 2 или 3 дозы с перерывом как минимум 4 недели.
- c** Полисахаридная вакцина вводится разово, ревакцинация рекомендована по конкретным показаниям.
- d** Разовую вакцинацию для всех лиц, начиная с возраста 18 лет, родившихся после 1970 года, с неясным анамнезом вакцинации, а также для лиц, которые не были привиты или были привиты лишь однократно в детстве рекомендуется проводить вакциной MMR.
- e** Стандартная прививка для девочек в возрасте от 9 до 13 или от 9 до 14 лет (в зависимости от используемой вакцины), количество доз см. информацию о препарате.
- f** Ревакцинация против столбняка и дифтерии рекомендована каждые 10 лет. Следующую плановую вакцинацию против столбняка и дифтерии следует провести одновременно с вакцинацией против коклюша и, если требуется по конкретным показаниям, против полиомиелита.