

CALENDRIER DE VACCINATION

Les vaccinations devraient se faire le plus tôt possible.
Une vérification du statut vaccinal est judicieuse à tout âge.
Il est recommandé de compléter immédiatement les vaccinations manquantes, conformément aux recommandations pour l'âge respectif.

Recommandations formulées par
l'équivalent allemand du Comité technique
des vaccinations (le STIKO), 2014.
www.stiko.de



Sprache: **Französisch**

VACCINATION	ÂGE	Nourrissons		Enfants en bas âge		Enfants			Adolescents		Adultes		
		(en semaines)	(en mois)			(en années)							
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	≥ 18
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tétanos		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	A (tous les 10 ans, f) N si nécessaire)		
Diphtérie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	A (tous les 10 ans, f) N si nécessaire)		
Coqueluche		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	A (f) (N si nécessaire)		
Poliomyélite		G1	G2 ^a	G3	G4	N				A1	N (si nécessaire)		
Hépatite B		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Hib <i>Haemophilus influenzae type b</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Pneumocoques		G1	G2	G3	G4	N					S ^c		
Rotavirus		G1 ^b	G2	(G3)									
Méningocoques Sérogroupe C					G1 (dès l'âge de 12 mois)	N							
Rougeole					G1	G2	N				S ^d		
Oreillons-Rubéole					G1	G2	N						
Varicelle					G1	G2	N						
Grippe Influenza											S (tous les ans)		
HPV Papillomavirus humains							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Prochain rendez-vous de vaccination



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

EXPLICATIONS

- G** IMMUNISATION DE BASE (administrée sous forme de 4 vaccinations partielles G1-G4)
- S** VACCINATION STANDARD
- A** VACCINATION DE RAPPEL
- N** VACCINATION DE RATTRAPAGE (Immunisation de base de toutes les personnes non encore vaccinées ou terminer une série de vaccinations incomplète)
- U** Test d'identification précoce
- J** Examen de jeunes (J1 âgés de 12 à 14 ans)

a Si un vaccin monovalent est administré, cette dose peut être supprimée.
b La 1^{ère} vaccination devrait se faire dès l'âge de six semaines; en fonction du vaccin utilisé, 2 ou 3 doses seront nécessaires à intervalle d'au moins 4 semaines.
c Vaccination unique par vaccin polysaccharidique, vaccination de rappel recommandée uniquement pour certaines indications.
d Vaccination unique pour toutes les personnes nées après 1970, âgées de 18 ans ou plus, ayant un statut vaccinal incertain ou inconnu, sans vaccination ou avec une seule vaccination pendant l'enfance. De préférence avec un vaccin ROR.
e Vaccination standard pour les filles âgées de 9 à 13 ou de 9 à 14 ans (selon le vaccin utilisé), pour le nombre de doses de vaccin, voir le résumé des caractéristiques du produit !
f Vaccination de rappel DT tous les 10 ans. La prochaine vaccination DT soit sous forme de vaccination unique DTaP, soit sous forme de vaccination combinée tétravalente DTaP-IPV, si indication correspondante.